


BCG

واکسین

موراو پلار لپاره له علاج وروسته

د BCG واکسین د خای ساتنه باید څرنګه وکړای شي



BCG


واکسين

ستاسي ماشوم ته له BCG واکسين ورکول کېدو وروسته تاسي څه تمه لرئ



په ۶-۱ اونيو کې، ښايي د وهل شوي سنتي په ځای کې يوه وره، سره ټناکه رابنکاره شي. دا به په يو څو اونيو کې روغه شي.

له ۶-۱۲ اونيو وروسته، دغه ټناکه ښايي په يو ورکوتي بهېدونکي ټپ بدل شي. که داسې وشي، نو د واکسين ځای په ممل سره پټ کړئ چې هوا ورته ورځي. نېټونکي پلستري پري ونه لگئ.



د ټپ په رغېدو کې ښايي درې مياشتې وخت ولگي، او ښايي چې په ځای بې يو داغ پاتې شي. دا نور مال ده.

د واکسين د ځای ساتنه بايد څرنگه وکړای شي

- ځای پاک او وچ وساتئ.
- که ټپ جوړ شي، نو ځای په ممل پټ کړئ څو هوا پکې دننه ورتللی شي.

په ځای نېټونکي پلستر مه لگئ.



په ځای زور مه کوئ او گروئ بې مه.



په ځای باندې چاپي يا هيڅ شې مه مړئ.



په ځای ملهم، تېل، يا بوټي مه ږدئ.



که تاسي کومې اندېښنې يا د TB يا د BCG واکسين په اړه معلوماتو ته اړتيا لرئ، نو د خپلې عامې روغتيايي نرسې سره اړيکه ونيسئ.

د عامې روغتيايي نرسې نوم: _____

تليفون: _____

که د ټاکلو د ساعتونو نه وروسته تاسي کومې پوښتنې يا اندېښنې لرئ نو لطفأ Healthline ته په دې شمېره زنگ ووهئ ۰۸۰۰ ۶۱۱ ۱۱۶