

واکسن BCG

مراقبت های بعدی
برای والدین

نحوه مراقبت از محل تزریق واکسن BCG




واکسن BCG

بعد از اینکه نوزادتان واکسن BCG را دریافت می کند، باید انتظار چه عوارض جانبی را داشته باشید



طی 1 الی 6 هفته، ممکن است یک تاول کوچک قرمز در محل تزریق واکسن ظاهر گردد. معمولاً این تاول باید ظرف چند هفته خوب شود.

بعد از 6 الی 12 هفته، ممکن است تاول به یک زخم کوچک آبی تبدیل شود. در این صورت، محل زخم را با گاز پانسمان بپوشانید تا هوا بتواند عبور کند. از چسب زخم استفاده نکنید.



مکن است 3 ماه طول بکشد تا زخم خوب شود. و شاید اثر زخم کوچکی بر جای بگذارد. این طبیعی است.

نحوه مراقبت از محل تزریق واکسن

- محل تزریق واکسن را تمیز و خشک نگه دارید.
- اگر در محل تزریق واکسن زخمی ایجاد شد، روی آن را با گاز بپوشانید تا هوا بتواند عبور کند.

چسب زخم یا امثال آن را روی محل تزریق واکسن نچسبانید.



محل تزریق واکسن را فشار ندهید و نخراشید.



محل تزریق واکسن را ماساژ یا مالش ندهید.



پماد، روغن یا داروهای گیاهی را در محل تزریق واکسن نمالید.



چنانچه سؤال و یا نگرانی دارید یا مایل به کسب اطلاعات بیشتری درباره TB یا واکسن BCG هستید، لطفاً با پرستار بهداشت عمومی خود تماس بگیرید.

نام پرستار بهداشت عمومی:

تلفن:

در خارج از ساعات اداری، سؤالات و دغدغه های خود را از طریق تماس با Healthline به شماره 0800 611 116 مطرح کنید.