


لقاح BCG

عناية الأباء والأمهات
بالطفل بعد التطعيم

كيفية العناية بموضع حقنة لقاح BCG




لقاح BCG

ما الذي يمكن أن تتوقع حدوثه بعد حصول طفلك على لقاح BCG



خلال فترة 1 - 6 أسابيع: قد يظهر انتفاخ بسيط أحمر في موضع إعطاء الحقنة، يختفي عادة خلال عدة أسابيع.

بعد 6 - 12 أسبوعاً: قد يتحول الانتفاخ البسيط إلى تقرّح بسيط يصدر إفرازات. فإذا حدث ذلك، قم بتغطية الموضع بالشاش للسماح للهواء بالدخول. لا تستخدم لصاقات الجروح العادية.



قد يظل التقرّح لمدة تصل إلى 3 أشهر حتى يشفى تماماً. وقد يترك ندبة بسيطة، وهو أمر عادي.

كيفية الاعتناء بموضع حقنة التطعيم

- حافظ على موضع الحقنة نظيفاً وجافاً.
- في حال حدوث تقرّح، قم بتغطية الموضع بقطعة شاش للسماح للهواء بالدخول.

لا تضع لصاقات الجروح العادية على موضع الحقنة.



لا تقم بالضغط على موضع الحقنة ولا تقم بحكّه.



لا تقم بحكّ أو بتدليك موضع الحقنة.



لا تستخدم المرهم، أو الزيوت، أو الأعشاب على موضع الحقنة.



إذا ساورك أي قلق أو احتجت لمعلومات حول لقاح TB أو لقاح BCG، الرجاء الاتصال بممرضة الصحة العامة في منطقتك.

اسم ممرضة الصحة العامة:

رقم الهاتف:

إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات خارج أوقات الدوام الرسمي، الرجاء الاتصال على خط الصحة Healthline على الرقم المجاني 0800 611 116.