

# BCG

접종

.....  
부모가 알아야 할  
접종 후 관리 요령  
.....

BCG 접종 부위 관리법





# BCG 접종

## BCG 접종 후 아기에게 일어날 수 있는 반응

접종 후 1~6 주 사이에 주사 부위에 빨갛게 작은 물집이 돌아날 수 있지만 몇 주 지나면 자연 치유되곤 합니다.

접종 후 6~12 주 사이에 물집이 작은 염증으로 변해 짓무를 수 있습니다. 이 경우, 접종 부위를 거즈로 덮어 공기가 통하게 하세요. **1회용 반창고를 붙이지 마세요.**

염증은 길어도 3개월 안에 아물며 이 때 흉터가 남을 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.



## 접종 부위 관리법

- 접종 부위를 청결하고 건조하게 유지하세요.
- 혹시 염증으로 발전하면 접종 부위를 거즈로 덮어 공기가 통하게 하세요.



접종 부위를 **꼭 쥐거나 긁지** 마세요.



접종 부위에 **1회용 반창고를 붙이지** 마세요.



접종 부위에 **연고나 오일, 약초를 바르지** 마세요.



접종 부위를 **문지르거나 마사지 하지** 마세요.

TB(결핵) 또는 BCG 접종에 대한 정보가 필요하거나 우려사항이 있을 경우, 공중보건 간호사에게 문의하세요.

공중보건 간호사 이름: \_\_\_\_\_

전화: \_\_\_\_\_

일과시간 이외에는 Healthline의 전화 0800 611 116을 이용해 궁금한 사항이나 우려점에 대해 문의하세요.