


BCG

(बीसीजी) टीके की दवाई

माता-पिता के लिए
(बीमारी के) बाद की देखभाल

BCG टीके की जगह की कैसे देखभाल की जाए



BCG

(बीसीजी) टीके की दवाई


आपके बच्चे को BCG का टीका लगाने के बाद आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं

1-6 सप्ताह के भीतर, इंजेक्शन लगाए जाने वाली जगह पर एक छोटा सा, लाल छाला हो सकता है। यह कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है।

6-12 हफ्तों के बाद, वह छाला एक छोटे से रिसने वाले घाव में बदल सकता है। अगर ऐसा होता है, तो उसे गॉज़ या जालीदार पट्टी से ढक दें ताकि उसे हवा लगती रहे।

चिपकने वाले प्लॉस्टर्स का इस्तेमाल न करें।

घाव को ठीक होने में तीन महीने तक का समय लग सकता है, और यह एक छोटा निशान छोड़ सकता है। ऐसा होना सामान्य है।



टीकाकरण वाली जगह की देखभाल कैसे की जाए

- इस जगह को स्वच्छ और सूखी रखें।
- अगर घाव विकसित होता है, तो उस जगह को गॉज़ या जालीदार पट्टी से ढक दें ताकि उसमें हवा जाती रहे।



उस जगह को दबाएं या खुरचें नहीं।



उस जगह पर चिपकने वाला प्लॉस्टर न लगाएं।



उस जगह पर मरहम, तेल, या जड़ी-बूटियों का प्रयोग न करें।



उस जगह को रगड़ें या उस पर मालिश न करें।

अगर आपको कोई चिन्ता है या TB अथवा BCG टीके की दवाई के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया अपनी पब्लिक हेल्थ नर्स से सम्पर्क करें।

पब्लिक हेल्थ नर्स का नाम: _____

फोन: _____

काम के समय के बाद अगर आपको कोई चिन्ता हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो **Healthline** (हेल्थलाइन) को 0800 611 116 नम्बर पर फोन करें।