

## BCGワクチンとは?

BCGワクチンは、注射によってTBに感染する危険性の高いお子さんに接種します。

BCGワクチンは、お子さんの免疫システムがTB(結核)を引き起こす病原菌と闘うのを助け、重篤なTBの発症を予防します。

.....

TBに感染する危険性の高い5歳未満のお子さんはBCGワクチンを無料で受けることができます。

ご質問または詳細は以下までお問い合わせください。

パブリックヘルスサービスの名称:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

住所: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

電話: \_\_\_\_\_

ウェブサイト: \_\_\_\_\_

詳細は下記のサイトをご覧ください。

.....

[www.health.govt.nz/tuberculosis](http://www.health.govt.nz/tuberculosis)



New Zealand Government

この資料はwww.health.govt.nz またはお住いの地域のDHB公認プロバイダーより入手できます。 Revised February 2015. Japanese. Code HE2214

# BCG ワクチン

## 親御さんへのご案内

結核(TB)に感染する危険性のある赤ちゃんとお子さんのために



**immunise**

their best protection

**immunise**

their best protection



## BCGを受ける必要のあるお子さんとは？

The Bacille Calmette-Guérin (BCG)ワクチンは、TBに感染する危険性の高い5歳未満のお子さんに接種します。

### お子さんがTBに感染する危険性が高く、無料のBCGワクチンを受けられるのは

- ・現在TBに感染している、または感染したことがある人がいる家の中や家族の間で暮らすことになる場合。
- ・親、同居人または養育者が過去5年以内に6ヶ月以上TBの罹患率が高い国に住んでいた場合。
- ・5歳までに3ヶ月以上TBの罹患率が高い国に住むことになり、TB感染者に接する可能性がある場合。

お子さんがTBに感染する危険性が高い場合は、助産師または医師がお知らせします。一般的にTBの罹患率が高いのは以下の地域です。

- ・ほぼアフリカ全域
- ・ほとんどの南米諸国
- ・ロシアと旧ソ連
- ・インド亜大陸
- ・中国、香港、台湾
- ・シンガポールを除く東南アジア
- ・太平洋諸国(但し、クック諸島、ニウエ、サモア、トケラウ諸島、トンガは除く)。

### TBとは？

- ・TBは伝染病で、疲労感、咳、発熱、息切れなどを引き起こします。
- ・TBは通常肺に影響を与えますが、リンパ節、骨、関節、腎臓など他の器官に影響が及ぶこともあります。また、髄膜炎を引き起こす場合もあります。
- ・TBは咳やくしゃみ、唾液で人から人へと空気感染します。
- ・ニュージーランドでは毎年約300人がTBを発病しています。

### お子さんをTBから守る方法

BCGワクチンを接種してお子さんに免疫を与えることができます。BCGワクチンは、お子さんの免疫システムがTBを引き起こす病原菌と闘うのを助けます。

ワクチンは上腕への注射によってお子さんに接種します。

### お子さんにBCGワクチンを接種するのに最適な時期

- ・お子さんが生まれてから数日～6ヶ月以内が接種するのに最適ですが、5歳になるまではいつでも接種できます。
- ・6ヶ月以上のお子さんであれば、TBの病原菌に感染したことがあるかを検査します。この検査結果に基づき、お子さんにワクチンを接種するかしないかを決めます。

### お子さんにワクチンを接種するには？

担当の助産師または医師に相談して予約を取ってください。または、最寄りのパブリックヘルスサービスに連絡し、お住いの地域を担当するBCGナースに相談してください。

詳細は裏ページをご覧ください。

### ワクチン接種後の反応

ワクチンに対して反応を起こすのは普通ですが、重篤な長期的合併症になるのはまれです。大抵のお子さんはBCG接種部位にただれを起こします。このただれは、治った後に痕を残す場合があります。

- ・1～6週間後、注射を打たれたところに小さな赤い水膨れができることがあります。
- ・6～12週間後、この水膨れがジクジクした小さなただれに変化することがあります。この場合、通気性のあるガーゼで接種部位を覆います。絆創膏は使わないでください。
- ・このただれは治るまでに3ヶ月ほどかかり、小さな痕が残る場合もありますが、これは通常の反応です。

### ワクチンの効果

BCGワクチンはTBを引き起こす病原菌への感染は防ぎませんが、お子さんの重篤なTBの発病予防には効果があります。

### ワクチンの予防効果の持続期間

接種後最大15年間はBCGワクチンが重篤なTBの発病を予防することを研究が示しています。