

# BCGワクチン

親御さんへ 接種後の注意

BCGワクチン接種部位のケア方法



**immunise**


their best protection

## お子さんがBCGワクチンを接種されると、以下のような変化が現れます

1～6週間後、注射を打たれたところに小さな赤い水膨れができることがあります。数週間で治ります。

6～12週間後、この水膨れがジクジクした小さなただれに変化することがあります。この場合、通気性のあるガーゼで接種部位を覆います。絆創膏は使わないでください。

このただれは治るまでに3ヶ月ほどかかり、小さな痕が残る場合もありますが、これは通常の反応です。



## ワクチン接種部位のケア方法

- 接種部位を清潔かつ乾いた状態に保ってください。
- ただれたら、接種部位を通気性のあるガーゼで覆います。



接種部位をつまんだり、ひっかいたりするのはやめてください。



接種部位に絆創膏を貼るのはやめてください。



接種部位に軟膏、オイル、ハーブなどを使うのはやめてください。



接種部位をこすったり、もんだりするのはやめてください。

TB (結核) またはBCGワクチンに関する情報やご心配な点については、担当のパブリックヘルスナーズにお問い合わせください。

パブリックヘルスナーズの名前: \_\_\_\_\_

電話: \_\_\_\_\_

時間外のお問い合わせは Healthline (0800 611 116) までお電話ください。