

ថ្នាំចាក់ការពារ BCG

បន្ទាប់ពីការថែទាំឪពុកម្តាយ

របៀបថែទាំកន្លែងចាក់ថ្នាំការពារ BCG



immunise


their best protection

ប្រការដែលត្រូវយល់ដឹង បន្ទាប់ពីកូនរបស់អ្នកទទួលបានការចាក់ថ្នាំការពារ BCG

ក្នុងរយៈពេលពី 1-6 សប្តាហ៍ មានពងបែកតូចៗពណ៌ក្រហម អាចកើតឡើងនៅត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ។ ករណីនេះ វានឹងជាសះស្បើយវិញក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍ក្រោយ។

បន្ទាប់ពីរយៈពេល 6-12 សប្តាហ៍ ពងបែកទាំងនោះ អាចក្លាយជាពងបែកតូចៗ ហើយឈឺចាប់ខ្លាំង។ ប្រសិនបើករណីនេះកើតឡើង ត្រូវយកស្បែករបស់កូននោះ ដោយទុកឱ្យខ្យល់អាចចូលបាន។ **ហាមប្រើបង់បិទដំបៅ។**

ការឈឺចាប់នេះ អាចមានរហូតដល់រយៈពេល 3 ខែ ទើបជាសះស្បើយ ហើយអាចនៅសល់សម្លាកតូចៗ។ ករណីនេះ ជាធម្មតា។



របៀបថែទាំកន្លែងចាក់ថ្នាំការពារ

- ត្រូវថែរក្សាកន្លែងចាក់ថ្នាំ ឱ្យបានស្អាត ហើយស្ងួតជានិច្ច
- ប្រសិនបើឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំង ត្រូវយកស្បែករបស់កូននោះ ដោយទុកឱ្យខ្យល់អាចចូលបាន។



ហាមរឹត ឬអះកន្លែងចាក់ថ្នាំ។



ហាមប្រើបង់បិទដំបៅ បិទនៅលើកន្លែងចាក់ថ្នាំ។



ហាមប្រើក្រមួន ប្រេង ឬរុក្ខជាតិថ្នាំ លាបនៅត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ។



ហាមរឹត ឬច្របាច់នៅត្រង់កន្លែងចាក់ថ្នាំ។

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ណាមួយ ឬត្រូវការព័ត៌មានអំពី TB ឬថ្នាំចាក់ការពារ BCG សូមទាក់ទងគិលានុបដ្ឋាកសុខភាពសាធារណៈរបស់អ្នក។

ឈ្មោះគិលានុបដ្ឋាកសុខភាពសាធារណៈ៖ _____

លេខទូរស័ព្ទ៖ _____

សម្រាប់ ឬសំណួរ ឬបញ្ហាផ្សេងៗដែលអ្នកមានក្រៅម៉ោងធ្វើការ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់ Healthline តាមរយៈពេល 0800 611 116.



New Zealand Government



their best protection