

# BCG واکسین

مور او پلار لپاره له علاج وروسته

د BCG واکسین د خای ساتنه باید څرنګه وکړای شي




**immunise**

their best protection

## ستاسي ماشوم ته له BCG واکسين ورکول کېدو وروسته تاسي څه تمه لرئ

په ۶-۱ اونيو کې، بڼايي د وهل شوي سنتي په ځای کې يوه وره سره تڼاکه رابښکاره شي. دا به په يو څو اونيو کې روغه شي.

له ۶-۱۲ اونيو وروسته، دغه تڼاکه بڼايي په يو ورکوتي بهېدونکي تپ بدل شي. که داسې وشي، نو د واکسين ځای په ململ سره پټ کړي چې هوا ورته ورځي. نښتونکي پلستري پرې ونه لگوي.



د تپ په رغېدو کې بڼايي درې مياشتي وخت ولگي، او بڼايي چې په ځای يې يو داغ پاتې شي. دا نورمال ده.

## د واکسين د ځای ساتنه بايد څرنگه وکړای شي

- ځای پاک او وچ ساتئ
- که تپ جوړ شي، نو ځای په ململ پټ کړئ څو هوا پکې دننه ورتللی شي.



په ځان نښتونکي پلستر مه لگوي.



په ځای زور مه کوئ او گروئ يې مه.



دغه ځای مړئ يا مساز کوئ مه.



په ځای ملهم، تېل، يا بوټي مه ږدئ.

که تاسي کومي انډيښني يا د TB يا د BCG واکسين په اړه معلوماتو ته اړتيا لرئ، نو د خپلې عامې روغتيايي نرسې سره اړيکه ونيسئ.

د عامې روغتيايي نرسې نوم:

تليفون:

که د ځانگړي ساعتو نه وروستو تاسي کومي پوښتنې يا انډيښني لرئ، نو لطفأ Healthline ته په ۱۱۶ ۶۱۱ ۰۸۰۰ زنگ ووهئ

immunise

Text

their best protection

New Zealand Government

hpa health promotion agency

MINISTRY OF HEALTH  
MANATU HAUORA

دا معلومات په [www.health.govt.nz](http://www.health.govt.nz) دستياب دي يا ستاسو په سيمه ييز DHB کې د مجاز وړاندي کوونکي څخه ترلاسه کړي.

Revised February 2015. Pushto. Code HE2239