

# لقاح BCG

عناية الآباء والأمهات بالطفل بعد التطعيم

كيفية العناية بموضع حقنة لقاح BCG




**immunise**

their best protection

## ما الذي يمكن أن تتوقع حدوثه بعد حصول طفلك على لقاح BCG

خلال فترة 1-6 أسابيع، قد يظهر انتفاخ بسيط أحمر في مكان إعطاء الحقنة يختفي عادة خلال عدة أسابيع.

بعد 6-12 أسبوعاً، قد يتحول الانتفاخ الى تقرح بسيط مع افرازات. إذا حدث ذلك، قم بتغطية المكان بالشاش للسماح للهواء بالدخول. لا تستخدم لصاقات الجروح العادية.



قد يظل التقرح الى مدة تصل الى ثلاثة أشهر حتى يلتئم تماماً. وقد يترك ندبة صغيرة، وهو أمر عادي.

## كيفية العناية بموضع حقنة لقاح BCG

- حافظ على موضع الحقنة نظيفاً وجافاً
- في حال حدوث تقرح، قم بتغطية المكان بقطعة شاش للسماح للهواء بالدخول.




لا تضع لصاقات الجروح العادية على موضع الحقنة.



لا تقم بالضغط على موضع الحقنة، أو بحكه.



لا تقم بالفرك على موضع الحقنة، أو بتدليكها.



لا تستخدم المراهم، أو الزيوت، أو الأعشاب على موضع الحقنة.

إذا ساورك أي قلق أو احتجت لمعلومات حول السل TB أو لقاح BCG، الرجاء الإتصال بمرمضة الصحة العامة.

اسم مرمضة الصحة العامة:

الهاتف:

إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات خارج أوقات الدوام الرسمي، الرجاء الإتصال على خط الصحة المجاني Healthline على الرقم 0800 611116.

immunise

their best protection



New Zealand Government