

BCG 접종

부모가 알아야 할 접종 후 관리 요령

BCG 접종 부위 관리법



immunise


their best protection

BCG 접종 후 어린이에게 일어날 수 있는 반응

접종 후 1-6주 사이에 주사 부위에 빨강게 작은 물집이 돌아날 수 있지만 몇 주 지나면 자연 치유되곤 합니다.

접종 후 6-12주 사이에 물집이 작은 염증으로 변해 짓무를 수 있습니다. 이 경우, 접종 부위를 거즈로 덮어 공기가 통하게 하세요. 1회용 반창고를 붙이지 마세요.

염증은 길어도 3개월 안에 아물며 이 때 흉터가 남을 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.



접종 부위 관리법

- 접종 부위를 청결하고 건조하게 유지하세요.
- 혹시 염증으로 발전하면 접종 부위를 거즈로 덮어 공기가 통하게 하세요.



접종 부위를 꼭 쥐거나 긁지 마세요.



접종 부위에 1회용 반창고를 붙이지 마세요.



접종 부위에 연고나 오일, 약초를 바르지 마세요.



접종 부위를 문지르거나 마사지 하지 마세요.

TB(결핵) 또는 BCG 접종에 대한 정보가 필요하거나 우려사항이 있을 경우, 공중보건 간호사에게 문의하세요.

공중보건간호사 이름: _____

전화: _____

일과시간 이외에는 Healthline의 전화 0800 611 116을 이용해 궁금한 사항이나 우려점에 대해 문의하세요.